



پیش بینی سه ماهه دما و بارش استان تهران (نیمه اردیبهشت تا نیمه مرداد ۱۴۰۴)


بر اساس خروجی مدل های اقلیمی پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد وابسته به سازمان هواشناسی کشور، میانگین بارش از نیمه اردیبهشت تا نیمه خرداد (می ۲۰۲۵) در نیمه شرقی استان در حد نرمال و اندکی کمتر از نرمال و در نیمه غربی استان ۵ تا ۱۰ میلی متر کمتر از میانگین بلند مدت پیش بینی می شود. از نیمه خرداد تا نیمه تیر (جون ۲۰۲۵) در مناطق مرکزی و جنوبی استان میانگین بارش در حد نرمال و اندکی کمتر نرمال و در نیمه شمالی استان ۵ تا ۱۰ میلی متر کمتر از میانگین بلند مدت خواهد بود. میانگین بارش از نیمه تیر تا نیمه مرداد (جولای ۲۰۲۵) در مناطق شمالی و مرکزی استان ۵ تا ۱۰ میلی متر کمتر از میانگین بلند مدت و در مناطق جنوبی استان در حد نرمال و اندکی کمتر از نرمال پیش بینی می شود (شکل ۱). بر اساس خروجی چند مدل عددی از نیمه اردیبهشت تا نیمه خرداد ۱۴۰۴ اختلاف میانگین بارش با بلند مدت در اغلب مناطق به جز غرب استان بین ۵- تا ۵ میلی متر و در مناطق غربی استان بین ۵- تا ۲۵- تغییر می کند. از نیمه خرداد تا نیمه تیر ۱۴۰۴ و از نیمه تیر تا نیمه مرداد ۱۴۰۴ در مناطق مختلف استان اختلاف میانگین بارش با بلند مدت بین ۵- تا ۵ میلی متر خواهد بود (شکل ۲). شایان ذکر است میانگین بلند مدت بارش استان تهران طی ماه های اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد به ترتیب ۸/۸، ۶/۵ و ۴/۴ میلی متر است.



نیمه تیر تا نیمه مرداد (جولای ۲۰۲۵)




نیمه خرداد تا نیمه تیر ۱۴۰۴ (جون ۲۰۲۵)




نیمه اردیبهشت تا نیمه خرداد ۱۴۰۴ (می ۲۰۲۵)


شکل (۱): پیش بینی انحراف از نرمال بارش برای نیمه اردیبهشت تا نیمه خرداد، نیمه خرداد تا نیمه تیر، نیمه تیر تا نیمه مرداد ۱۴۰۴



نیمه تیر تا نیمه مرداد (جولای ۲۰۲۵)



نیمه خرداد تا نیمه تیر ۱۴۰۴ (جون ۲۰۲۵)



نیمه اردیبهشت تا نیمه خرداد ۱۴۰۴ (می ۲۰۲۵)

شکل (۲): بی هنجاری بارش برای نیمه فروردین تا نیمه تیر ۱۴۰۴ (می، جون و جولای ۲۰۲۵) بر اساس خروجی چند مدل عددی

دمای میانگین از نیمه اردیبهشت تا نیمه خرداد (می ۲۰۲۵) ۱ تا ۲ درجه سلسیوس بیشتر از میانگین بلند مدت پیش بینی می شود. انتظار می رود از نیمه خرداد تا نیمه تیر (جون ۲۰۲۵) دمای میانگین در جنوب و جنوب غرب استان ۱ تا ۲ درجه سلسیوس و در سایر مناطق ۰/۵ تا ۱ درجه سلسیوس بیشتر از میانگین بلند مدت باشد. از نیمه تیر تا نیمه مرداد (جولای ۲۰۲۵) دمای میانگین ۰/۵ تا ۱ درجه سلسیوس بیشتر از میانگین بلند مدت برآورد می شود (شکل ۳). میانگین بلند مدت دمای استان تهران طی ماه های اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد به ترتیب ۱۷/۸، ۲۴/۱، ۲۷/۷ و ۲۷/۵ درجه سلسیوس بوده است.


تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۰۱

سازمان هواشناسی کشور



شماره: ۱۴۰۴-۰۲

اداره کل هواشناسی استان تهران



نیمه تیر تا نیمه مرداد (جولای ۲۰۲۵)


نیمه خرداد تا نیمه تیر ۱۴۰۴ (جون ۲۰۲۵)

نیمه اردیبهشت تا نیمه خرداد ۱۴۰۴ (می ۲۰۲۵)


شکل (۳): پیش بینی انحراف از نرمال دما برای نیمه اردیبهشت تا نیمه خرداد، نیمه خرداد تا نیمه تیر، نیمه تیر تا نیمه مرداد ۱۴۰۴

پیش بینی هفتگی:

بر اساس خروجی مدل های اقلیمی پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد میانگین دما از ۱ تا ۷ اردیبهشت، از ۸ تا ۱۴ اردیبهشت و از ۱۵ تا ۳۱ اردیبهشت در مناطق مختلف استان ۳ تا ۶ درجه سلسیوس بیشتر از نرمال خواهد بود (شکل ۴). از ۱ تا ۷ اردیبهشت بارش میانگین در مناطق شمالی ۱۰ تا ۳۰ میلی متر و در سایر مناطق استان ۰ تا ۱۰ میلی متر کمتر از میانگین بلند مدت پیش بینی شده است. از ۸ تا ۱۴ اردیبهشت به جز مناطق کوچکی از شمال و شمال شرق استان که بارش ۱۰ تا ۳۰ میلی متر کمتر از نرمال برآورد شده است در سایر مناطق بارش ۰ تا ۱۰ میلی متر کمتر از میانگین بلندمدت خواهد بود. از ۱۵ تا ۳۱ اردیبهشت بارش نسبت به بلند مدت در بیشتر مناطق استان ۰ تا ۱۰ میلی متر کمتر و در جنوب شرق استان بی تغییر پیش بینی شده است (شکل ۵).



شکل (۴): پیش بینی انحراف از نرمال دما برای ۱ تا ۷ اردیبهشت، ۸ تا ۱۴ اردیبهشت، ۱۵ تا ۳۱ اردیبهشت



شکل (۵): پیش بینی انحراف از نرمال بارش برای ۱ تا ۷ اردیبهشت، ۸ تا ۱۴ اردیبهشت، ۱۵ تا ۳۱ اردیبهشت